

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 22-8-69 957092

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION "AQUITAINE" (Tél. 92.06.25 et 92.26.94)

ABONNEMENT ANNUEL

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE,
LANDES, BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes, Direction Départementale de l'Agriculture

Chemin d'Artigues, 33 - CENON

C. C. P. : BORDEAUX 6702-46

25 F.

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 107 d'Août 1969

1969-26

AVERTISSEMENTS

V I G N E

Mildiou : Dans l'ensemble, la végétation est encore très active et des taches de Mildiou ont pu être observées sur les jeunes feuilles. En outre, les pluies parfois abondantes de la mi-août ont plus ou moins délavé les produits.

En conséquence, un traitement devrait être appliqué dès à présent, en particulier dans les Charentes et dans les Basses Pyrénées, où l'encépagement est plus tardif.

Dans les autres régions où la véraison est proche, ce traitement apparaît moins utile. Il pourrait néanmoins protéger les jeunes feuilles sensibles, mais elles sont le plus souvent éliminées par les rognages.

Toutefois, il convient de continuer à protéger les jeunes plantations.

Black-Rot : Les premières attaques sur les grappes viennent d'apparaître dans les foyers. D'autres risquent d'apparaître vers la fin du mois.

Un traitement ne sera appliqué que dans les vignes où les taches étaient nombreuses sur les feuilles au début du mois de Juillet.

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des pommes et des poires : Continuer la protection en appliquant au cours des prochains jours une nouvelle pulvérisation insecticide.

Tordeuse orientale sur pomacées : Dans les plantations situées à proximité de vergers de pêcheurs, les premiers dégâts de Tordeuse orientale peuvent apparaître prochainement.

Le traitement préconisé contre le Carpocapse sera également efficace s'il est effectué avec l'un des produits ci-dessous :

Aziaphos - Carbaryl - DDT - Fémitrothion - Parathions - Phosalone.

aux doses préconisées contre la Tordeuse orientale (voir liste adressée aux abonnés en début d'année).

P361.../...

.../...

Tordeuse orientale sur pêcher : Le danger persiste sur les variétés les plus tardives.

En conséquence, mais seulement dans le cas de récolte postérieure au 30 août, appliquer un traitement à base de Mévinphos à 50 g. de matière active par hectolitre d'eau (délai légal d'utilisation : 7 jours avant la récolte).

Dans les pépinières, assurer la protection des greffes, par des pulvérisations effectuées trois à quatre jours après l'écussonnage.

Bordeaux, le 20 Août 1969

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chargé des Avertissements Agricoles
C. ROUSSEL

Pour l'Inspecteur de la Protection
des Végétaux et p.i.
M. LARGE